

BCG接種後の注意事項


(乳 児)

《BCG接種後の注意》

- ★ BCGを接種した日は、お風呂に入ってもかまいません。接種部位をもんだり、こすったり、ひっかいたりしないようにして下さい。
- ★ BCGを接種した日は、接種部位に直射日光が当たらないようにして下さい。
- ★ BCGを接種した後、接種部位を10日くらい観察して下さい。

《通常の接種部位の変化》


- ★ BCG接種後10日目ぐらいから接種した針のあとが赤いポツポツになり、一部に小さいうみをもつことがあります。この反応は、接種後4週間頃に最も強くなりますが、その後はかさぶたになり、かさぶたがとれると、あと(痕)はきれいになります。接種部位のかさぶたがとれるまでは、もんだり、こすったり、ひっかいたりしないでその場所を清潔に保ちましょう。



接種後10日頃



接種後4週間頃




接種後3ヶ月頃

※ 接種部位の反応には個人差がありますので、写真のような経過になるとはかぎりませんが心配いりません。

《接種後10日以内に接種局所が強い発赤、腫れ、化膿(黄白い“うみ”)した場合》

- ★ 写真のように通常の反応よりも強く接種部位に発赤、腫れ、化膿(黄白い“うみ”)が10日以内の短期間に出現した場合は、検査が必要な事もありますので、下記の宮城県結核予防会複十字健診センター又は健康相談所興生館にご連絡下さい。



接種後10日以内

赤い腫れと針あとの化膿(黄白い“うみ”)が見られる。

※接種後、3日目頃の出現が多くみられます。

(この反応が見られた場合、診察の参考にいたしますので、お手持ちのカメラ付携帯電話やデジタルカメラ等で撮影をお願いいたします。)

※ 接種後、4週間頃に上の写真のような反応は、通常の反応ですので心配いりません。

《接種後3ヶ月以上過ぎてひどく腫れている場合、わきの下のリンパ節が腫れた場合》

- ★ BCG接種による副反応と思われるので、下記の宮城県結核予防会複十字健診センター又は健康相談所興生館にご連絡下さい。

※公益財団法人結核予防会発行「現場で役に立つ直接BCG接種の手引き」より転載。(写真)

連絡先

公益財団法人 宮城県結核予防会

複十字健診センター
仙台市青葉区中山吉成2-3-1

TEL 719-5161

健康相談所興生館
仙台市青葉区宮町1-1-5

TEL 221-4461

月曜日～金曜日(祝日を除く) 8:30～17:00