

BCG 接種後の注意事項

《BCG 接種後の注意》

☆BCG を接種した日は、お風呂に入ってもかまいません。接種部位をもんだり、こすったり、ひっかいたりしないようにして下さい。

☆BCG を接種した日は、接種部位に直射日光が当たらないようにして下さい。

☆BCG を接種した後、接種部位を 10 日くらい観察して下さい。

《通常接種部位の変化》

- ・BCG 接種後 10 日目ぐらいから接種した針のあとが赤いポツポツになり、一部に小さいうみをもつことがあります。この反応は、接種後 4 週間頃に最も強くなりますが、その後はかさぶたになり、かさぶたがとれると、あと（痕）はきれいになります。接種部位のかさぶたがとれるまでは、もんだり、こすったり、ひっかいたりしないでその場所を清潔に保ちましょう。



接種後 10 日頃



接種後 4 週間頃



接種後 3 ヶ月頃

※ 接種部位の反応には個人差がありますので、写真のような経過になるとはかぎりませんが心配いりません。

《接種後 10 日以内に接種局所が強い発赤、腫れ、化膿（黄白い“うみ”）した場合》

- ・写真のように通常の反応よりも強く接種部位に発赤、腫れ、化膿（黄白い“うみ”）が 10 日以内の短期間に出現した場合は、検査が必要な事もありますので、下記の結核予防会宮城県支部複十字健診センター又は健康相談所興生館にご連絡下さい。



接種後 10 日以内

赤い腫れと針あとの化膿（黄白い“うみ”）が見られる。

※接種後、3 日目頃の出現が多くみられます。

（この反応が見られた場合、診察の参考にいたしますので、お手持ちのカメラ付携帯電話やデジタルカメラ等で撮影をお願いいたします。）

※ 接種後、4 週間頃に上の写真のような反応は、通常の反応ですので心配いりません。

《接種後 3 ヶ月以上過ぎてひどく腫れている場合、わきの下のリンパ節が腫れた場合》

- ・BCG 接種による副反応とと思われますので、下記の結核予防会宮城県支部複十字健診センター又は健康相談所興生館にご連絡下さい。

※財団法人結核予防会発行「現場で役に立つ直接BCG接種の手引き」より転載。（写真）

（連絡先） （財）結核予防会宮城県支部

複十字健診センター

仙台市青葉区中山吉成 2-3-1 Tel 022-719-5161

健康相談所 興生館

仙台市青葉区宮町 1-1-5 Tel 022-221-4461

月曜日～金曜日（祝日を除く）8：30～17：00 土曜日（4～9月のみ、ただし、祝日を除く）8：30～12：00